

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-2-75007220

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3
Tél. (78) 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

C. C. P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 25

19 Février 1975

Arbres fruitiers

Malgré l'avance exceptionnelle de la végétation, il n'est pas encore certain que la récolte soit réduite ultérieurement par le gel, du moins dans les zones peu gélives, de sorte qu'aucun relâchement dans l'application des traitements n'est à envisager.

Monilia de l'abricotier - Maintenir la protection suivant les prescriptions du bulletin précédent.

Tavelures - Sur pommier, les spores ne sont parvenues à maturité que dans les climats les plus favorables et d'autre part la végétation n'est pas encore réceptive de sorte que le premier traitement peut encore être différé.

- Sur poirier, les ~~ascospores~~ sont peu nombreuses du fait de la rareté des attaques en 1974, mais leur maturité paraît atteinte dans certaines régions. D'autre part, les conidies (spores émises par les pustules de la tavelure sur rameaux) peuvent déjà provoquer des contaminations, de sorte que le premier traitement devra être appliqué au fur et à mesure de l'arrivée des diverses variétés au stade C3 (parties vertes apparentes au sommet du bourgeon à fruits) et même dès réception dans les régions chaudes et plus largement sur variétés précoces où ce stade est déjà atteint.

Oïdium du pommier - Toute période de beau temps doux et calme étant très favorable à un développement précoce de l'oïdium dans des vergers au sol très humide, la protection doit être envisagée dès maintenant.

Cultures diverses

Charançon de la tige du colza - Des insectes ont déjà été capturés dans les zones chaudes de la Circonscription.

Si le temps doux avec des températures sous abri de l'ordre de 14° se maintient, un traitement s'imposera dès maintenant dans les zones basses de la Drôme, de l'Ardèche, du Nord ouest de l'Isère et du Sud de la Loire et du Rhône.

Cécidomyie de la Lavande - Si le temps doux et relativement humide se maintient, un traitement s'imposera dès réception dans les zones basses du bassin du Roubion (au dessous de 300 m d'altitude) et de la Drôme (au dessous de 250 m), sinon ce traitement sera appliqué au prochain réchauffement et, si ce dernier est plus important que les précédents, étendu à des altitudes plus élevées, de 150 à 300 m suivant les expositions. De toutes façons le prochain bulletin précisera le cas échéant ces modalités.

L'Ingénieur d'Agronomie chargé
des Avertissements Agricoles
P. LATARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
A. PITHIoud

P204